



# AMINEX® 720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

FECHA DE ACTUALIZACION : OCTUBRE 2024



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.S.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57 1) 745 15 24  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

**2,4 – D AMINA** En forma de Sal dimetilamina del ácido (2,4-diclorfenoxi)acético..... 720 g/L  
**Aditivos** ..... c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. PL0003582023

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.S - AGROSER S.A.S.

## RECOMENDACIONES DE USO

**AMINEX® 720 SL**, es un herbicida hormonal post emergente selectivo, para el control de malezas de hojas anchas en los cultivos de maíz, caña de azúcar y potreros. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3-4 días después de la aplicación. Para que el producto desarrolle su óptima actividad herbicida, las malezas deberán encontrarse en un período de crecimiento activo. En malezas leñosas, el mejor momento de la aplicación es el principio de la floración. Contra malezas rastreras, aplicar antes o durante la floración. Plantas expuestas al sol, responden mejor a la acción del producto.

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	PC	PR	LMR
<b>MAIZ</b>	VERDOLAGA (Portulaca oleracea) BOTONCILLO (Caperonia palustris) ESCOBA NEGRA (Sida acuta) AMOR SECO (Biden pilosa) BLEDO (Amaranthus dubius)	1.5 L/Ha	N/A	0 Horas	2,4-D AMINA 0.05
<b>POTREROS</b>	DORMIDERA (Mimosa púdica) CHILINCHIL (Cassia tora) CADILLO (Desmodium tortuosum) VIERNES SANTO (Phyllanthus niruri) PATEGORGOLA (Croton trinatis)	1.0 L/Ha	N/A		2,4-D AMINA 360
<b>CAÑA DE AZUCAR</b>	BATATILLA (Ipomoea congesta) CHILINCHIL (Cassia tora) BLEDO (Amaranthus dubius) GUALOLA (Polygonum segetum) VERDOLAGA (Portulaca oleracea) ESPALELLA (Corchorus orinocensis)	1.5 L/Ha	N/A		2,4-D AMINA 0.05
<b>ARROZ</b>	VIERNES SANTO (Phyllanthus niruri) VERDOLAGA (Portulaca oleracea) VERBENA (Verbena litoralis) PEGA PEGA (Desmodium tortuosum) PALO DE AGUA (Jussiaea linifolia) BLEDO (Amaranthus dubius)	1.0 L/Ha	N/A		2,4-D AMINA 0.02

## PREPARACION DE LA MEZCLA

Agregue agua al tanque de preparación hasta ¼ o hasta la mitad de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica. No es recomendable hacer mezclas con sustancias alcalinas. or menos 12 horas después de la última aplicación”.

## COMPATIBILIDAD

**AMINEX® 720 SL**, no es compatible con herbicidas cuya formulación sea emulsionable en agua, pero si puede mezclarse con productos en forma de polvos mojables, gránulos dispersables y solubles en agua.

## RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

**LIGERAMENTE PELIGROSOS 4**

