



VERDUGO

ACARICIDA - INSECTICIDA AGRÍCOLA
FECHA DE APROBACION: ABRIL 2023



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agrosarag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

SPIROMESIFEN 3-mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4,4]non-3-en-4-yl 3,3-dimethylbutyrate. 240 g/L, formulación a 20 °C.....240 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

REGISTRO NACIONAL ICA No. PL0000202023

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

VERDUGO es un insecticida-acaricida perteneciente al grupo químico de los derivados del ácido tetrónico y tetramico. Interfiere con la biosíntesis de lípidos, afectando el desarrollo y fecundidad de los ácaros. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir

Cultivo	Plaga	Dosis	PC	PR
ORNAMENTALES*				
Clavel, Pompón y Alstroemeria	Ácaros (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	0.6 - 0.8 L/ha	N.A	4 horas

P.C: Periodo de Carencia: Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

N.A: No Aplica

*Cultivos ornamentales de acuerdo a la Resolución 1418 del 18 de febrero de 2016.

*Debido al alto número de especies ornamentales que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objetivo de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada

EPOCA DE APLICACION

Se recomienda realizar una aplicación de **VERDUGO (Spiromesifen 240 g/L- SC)** en dosis de 0.6 - 0.8 L/ha vía foliar dependiendo de la presión de la plaga, asegurando una buena cobertura en la planta. Se recomienda hacer la aplicación cuando se observe la presencia de las primeras poblaciones de ácaros, con un umbral de un individuo móvil por foliolo y dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Llene el tanque de mezcla hasta la mitad, vierta la dosis exacta de VERDUGO y agite bien la mezcla para obtener una solución homogénea y termine de llenar con agua. Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla al igual que los equipos, deben lavarse en forma adecuada.

COMPATIBILIDAD

VERDUGO, no se debe mezclar sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**